

November 2021

Zovir 5 % creme
Aciclovir

Der findes to pakningsstørrelser af **Zovir 5 % creme**. Den fås som henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider.

Første indlægsseddel er på Zovir 5 % creme 10 g (receptpligtig) og anden indlægsseddel er på Zovir 5 % creme 2 g (ikke receptpligtig).

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovir 5 % creme aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir
3. Sådan skal du bruge Zovir
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovir virker ved at hæmme formering af herpesvirus og anvendes til behandling af herpes infektioner i huden både ved første udbrud og tilbagevendende udbrud.

Zovir anvendes til behandling af forkølelsessår på mund, læber og i ansigtet (herpes labialis) samt ved herpes på kønsorganerne (herpes genitalis).

Lægen kan have givet dig Zovir for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Zovir

- hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir, propylenglycol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovir (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Zovir.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Zovir

- hvis du har herpes på kønsorganerne. På grund af risiko for smittefare skal du undgå seksuel kontakt, så længe der er synlige læsioner
- hvis du har et stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen om behandling af enhver infektion.

Undgå at få cremen i øjne, mund eller i skeden. Cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. Cremen er dog ikke skadelig, hvis du får lidt i munden og synker den.

Kontakt lægen, hvis såret er eller bliver alvorligt.

Brug af andre lægemidler sammen med Zovir

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Zovir.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovir efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Amning

Du kan bruge Zovir, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovir påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Zovir indeholder propylenglycol, natriumlaurilsulfat og cetostearylalkohol

Dette lægemiddel indeholder 400 mg propylenglycol pr. g creme.

Propylenglycol kan give irritation af huden.

Brug ikke dette lægemiddel til babyer under 4 uger med åbne sår eller store områder med beskadiget hud (som ved forbrændinger) uden at tale med din læge eller apotekspersonalet.

Dette lægemiddel indeholder 7,5 mg natriumlaurilsulfat pr. g creme.

Natriumlaurilsulfat kan medføre lokale hudreaktioner (f.eks. stikkende eller brændende fornemmelse) eller øge hudreaktioner forårsaget af andre produkter, når de påføres samme område.

Dette lægemiddel indeholder cetostearylalkohol. Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Zovir

Brug altid Zovir nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Crementen påføres 5 gange daglig i mindst 4 dage ved behandling på mund, læber og i ansigt og mindst 5 dage ved behandling af herpes på kønsorganerne.

Behandling bør ikke overstige 10 dage. Behandlingen skal påbegyndes så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret.

Vask hænderne før og efter påsmøring af crementen, for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning, skal du undgå at berøre det angrebne område unødigt og undgå intim kontakt.

Hvis du har brugt for meget Zovir

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Zovir, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Zovir

Smør straks creme på og fortsæt behandlingen som hidtil.

Hvis du holder op med at tage Zovir

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

- Mild udtørring og afskalning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

- Forbigående svie eller brændende fornemmelse
- Kløe.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- Rødmen af huden
- Kontakteksem

- Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zovir koldt.

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovir creme 5 % indeholder:

Aktivt stof: aciclovir.

Øvrige indholdsstoffer: propylenglycol, hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, dimeticon, macrogolstearat, glycerolmonostearat, poloxamer, natriumlaurilsulfat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid creme.

Pakningsstørrelse

Tube 10 g.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark

Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller:

GlaxoSmithKline Pharmaceutical S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Polen

eller

GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovir 5 %, creme, 2g aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir
3. Sådan skal du bruge Zovir
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovir er et middel mod forkølelsessår (herpes), der virker ved at hæmme herpesvirus.

Du kan bruge Zovir til forkølelsessår på mund og læber samt i ansigtet.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Zovir for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir

Brug ikke Zovir

Hvis du er allergisk over for det aktive stof aciclovir, det beslægtede stof valaciclovir, propylenglycol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovir (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Zovir:

- Hvis du har et dårligt immunforsvar og er lettere modtagelig over for infektioner (f.eks. pga. AIDS eller hvis du er knoglemarvstransplanteret).

- Hvis er i tvivl om du har forkølelsessår.
- Hvis du har en svær grad af forkølelsessår.
- Hvis såret ikke er fuldt helet efter 10 dage eller hvis det bliver værre.

Du må ikke bruge Zovir creme på slimhinder (f.eks. i munden, øjnene eller på kønsdelene), da cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. Du bør især undgå at få det i øjnene. Skyl med rigeligt varmt vand, hvis du får cremen i øjnene. Tal med lægen, hvis du er bekymret.

Hvis forkølelsessårene bliver ved med at komme igen, bør du kontakte lægen.

Brug af andre lægemidler sammen med Zovir

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Du kan bruge Zovir sammen med andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Zovir.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovir efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Amning

Du kan bruge Zovir, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovir creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Zovir indeholder propylenglycol, natriumlaurilsulfat og cetostearylalkohol

Dette lægemiddel indeholder 400 mg propylenglycol pr. g creme.
Propylenglycol kan give irritation af huden.

Dette lægemiddel indeholder 7,5 mg natriumlaurilsulfat pr. g creme.
Natriumlaurilsulfat kan medføre lokale hudreaktioner (f.eks. stikkende eller brændende fornemmelse) eller øge hudreaktioner forårsaget af andre produkter, når de påføres samme område.

Dette lægemiddel indeholder cetostearylalkohol. Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Zovir

Brug altid Zovir nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 2 år:

Brug cremen 5 gange daglig med ca. 4 timers mellemrum i mindst 4 dage (omkring hver 3.-4. time undtagen om natten). Behandlingen kan fortsættes i op til 10 dage, hvis heling af såret ikke er sket efter 4 dage. Hvis såret ikke er helet efter 10 dage, kontaktes lægen.

Brug nok creme til at dække området med forkølelsessår, inklusiv kanten rundt om såret.

Det anbefales at begynde behandlingen så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Hav altid Zovir creme med dig, så du kan begynde behandlingen af det næste udbrud så hurtigt som muligt.

Vask hænder før og efter påsmøring af cremen for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning til andre dele af kroppen eller i øjnene skal du undgå at berøre såret unødvendigt eller at lade andre gøre det.

Ved dosering med pumpen:

Hold fingerspidsen helt ind mod pumpens åbning for ikke at få for meget creme ud. Første gang kan det være nødvendigt at ryste pumpen og trykke flere gange på pumpen, før cremen kommer ud.

Børn under 2 år: Du må kun bruge Zovir til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Hvis du har brugt for meget Zovir

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovir, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du ved et tilfælde bruger for meget eller sluger cremen er det usandsynligt at du oplever utilsigtede virkninger. Dog anbefales det at kontakte lægen eller apotekspersonalet, hvis du sluger en stor mængde af cremen.

Hvis du har glemt at bruge Zovir

Smør straks creme på såret og fortsæt behandlingen som hidtil.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Zovir kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Akut overfølsomhedsreaktion (hævelse af tunge, læber og/eller ansigt)
- Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

- Mild udtørring af huden
- Afskalning af huden

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

- Forbigående svie eller brændende fornemmelse
- Kløe

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- Rødme i huden
- Kontakteksem
- Nældefeber

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zovir doseringspumpe ved temperaturer over 25°C.

Opbevar ikke Zovir tube eller doseringspumpe i køleskab.

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovir creme indeholder:

- Aktivt stof: Aciclovir.
- Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, dimeticon, poloxamer, glycerol monostearat, macrogolstearat, natriumlaurylsulfat, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid creme.

Pakningsstørrelser

Tube: 2 g.

Doseringspumpe: 2 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021.