

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears
3. Sådan skal du bruge Viscotears
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Viscotears er en kunstig tårevæske (gel med carbomer), som anvendes ved nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i øjnene). Viscotears fugter øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare i op til 6 timer.

Viscotears kan fås uden recept.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Viscotears

- hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Viscotears.

Hvis du oplever øjensmerter, synsforandringer, øjenirritation, vedvarende rødme, eller hvis tilstanden forværrer eller varer ved, skal du holde op med at bruge Viscotears og kontakte lægen.

Børn og unge under 18 år

Sikkerhed og virkning af Viscotears hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg.

Brug af anden medicin sammen med Viscotears

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Viscotears kan anvendes under graviditet og i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Viscotears, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

Viscotears indeholder cetrimidHvis du bruger kontaktlinser:

Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Viscotears og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

Viscotears indeholder cetrimid, som kan give øjenirritation og er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.

3. Sådan skal du bruge Viscotears

Brug altid Viscotears nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis erVoksne

1 dråbe 3-4 gange daglig i hvert øje efter behov.


Børn og unge under 18 år

Sikkerhed og virkning af Viscotears hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg.

Brug kun Viscotears til at dryppe i øjet/øjnene.

Sådan skal du bruge Viscotears

1. Hent Viscotears-tuben.
2. Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.
3. Skru låget af tuben.
4. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad med en ren finger.
5. Hold tubetubespiden tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
6. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med tubespiden. Det kan forurene gelen i tuben.
7. Hold tuben lodret med spidsen pegende nedad (se billedet) – derved dannes der en lille dråbe på spidsen og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).
8. Hvis du bruger Viscotears i begge øjne, gentages trinene 4-7 for det andet øje.
9. Skru til sidst låget på tuben umiddelbart efter brug.



Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger andre øjendråber, øjensalve eller gelpræparater samtidig med Viscotears, så vent mindst 5 minutter mellem Viscotears og de øvrige øjenpræparater. Øjensalver og -geler (Viscotears) skal altid tages sidst.

Hvis du har brugt for meget Viscotears

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Viscotears, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der forventes ingen bivirkninger med Viscotears.

Hvis du har glemt at bruge Viscotears

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Viscotears

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan opleve følgende reaktioner i dine øjne:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Sløret syn.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):
Ubehag i øjet, skorper på kanten af øjenlåget, øjenirritation.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):
Hævelse i øjet, øjensmerter, kløe i øjet, rødme i øjet, øget tåreproduktion.

Eller reaktioner i andre dele af kroppen:
Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):
Betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden.

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):
Reaktioner i andre dele af kroppen: Allergi (overfølsomhed).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.
Pakningen forbliver steril, indtil originalhætten er brudt.
Holdbarhed efter åbning: 4 uger.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viscotears indeholder:

- Aktivt stof: carbomer. 1 g gel indeholder 2 mg carbomer.
- Øvrige indholdsstoffer: cetrimid (konserveringsmiddel), natriumhydroxid (til justering af pH), sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Viscotears er en klar, farveløs gel, der leveres i 10 g tuber.

Pakningsstørrelser: 10 g og 3 x 10 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Viscotears® er et registreret varemærke, der tilhører Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH.

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2022.